



E9-00059
551293
Maths S

Code épreuve : 297

Nombre de pages : 28

Session : 2022

Épreuve de : Mathématiques S EDHEC

Consignes

- Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer
- Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir
- Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite)
- Numéroté chaque page (cadre en bas à droite)
- Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre

Exercice 1 :

Q1. On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$$

D'où :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \int_{-\infty}^a f(x) dx > 0 \quad \text{par positivité de l'intégrale}$$

$$\text{d'où : } F(a) > 0$$

Donc : $x \mapsto \frac{f(x)}{F(a)}$ est bien définie sur $]-\infty, a]$
et la fonction nulle sur $]a, +\infty[$

Donc :

g est bien définie sur $\mathbb{R}$

On a :

- $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) \geq 0$
- g est continue sur $]-\infty, a]$ (car f l'est) et sur $]a, +\infty[$ donc sur $\mathbb{R} \setminus \{a\}$

• Enfin, on a :

$$\begin{aligned} \forall (A, B) \in]-\infty, a] \times]a, +\infty[, \int_A^B g(x) dx &= \int_A^a g(x) dx \quad (g \text{ nulle sur }]a, B]) \\ &= \int_A^a \frac{f(x)}{F(a)} dx \\ &= \frac{1}{F(a)} [F(x)]_A^a \\ &= \frac{F(a) - F(A)}{F(a)} \end{aligned}$$

On: $F(A) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 0$ d'où :

$$\int_A^{+\infty} g(x) dx \xrightarrow{A \rightarrow -\infty} \frac{F(a)}{\underbrace{F(a)}_{=1}}$$

Donc :

g peut être considérée comme densité d'une certaine variable aléatoire (VAR) notée Y

Q2.a. On a :

$$\begin{aligned} \forall x \in]-\infty, a], G(x) &= \int_{-\infty}^x g(t) dt \\ &= \frac{F(x)}{F(a)} \end{aligned}$$

D'où :

$$G : x \mapsto \begin{cases} \frac{F(x)}{F(a)} & \text{si } x \leq a \\ 1 & \text{si } x > a \end{cases}$$

Q2.b. D'après la formule de Bayes, on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, P_{(X \leq a)}(X \leq x) &= \frac{P(X \leq a, X \leq x)}{P(X \leq a)} \\ &= \begin{cases} \frac{F(x)}{F(a)} & \text{si } x \leq a \\ 1 & \text{si } x > a \end{cases} \end{aligned}$$

car : $\begin{cases} P(X \leq a, X \leq x) \\ = P(X \leq x) \text{ si } x \leq a \\ = P(X \leq a) \text{ si } x > a \end{cases}$

D'où : $\forall x \in \mathbb{R}, G(x) = P_{(X \leq a)}(X \leq x)$

Q3.a. Puisque, pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, $Y_i(\Omega) \subset]-\infty, a]$, on a:
 $M_m(\Omega) \subset]-\infty, a]$

D'où :

- $\forall x > a, G_m(x) = 1$
- $\forall x \leq a, G_m(x) = \mathbb{P}(\max(Y_1, \dots, Y_m) \leq x)$

$$= \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^m (Y_k \leq x)\right)$$

$$= \prod_{k=1}^m \underbrace{\mathbb{P}(Y_k \leq x)}_{= G(x)}$$

(indépendance
des événements)

D'où :

$$\underline{G_m = G^m \text{ sur } \mathbb{R}}$$

Donc :

$$\underline{\forall x \in \mathbb{R}, G_m(x) = \begin{cases} \left(\frac{F(x)}{F(a)}\right)^m & \text{si } x \leq a \\ 1 & \text{si } x > a \end{cases}}$$

Q3.b. On a :

$\forall x < a, F(x) < F(a)$ (stricte croissance de F)

D'où : $\forall x < a, 0 < \frac{F(x)}{F(a)} < 1$

Donc : $\forall x < a, \left(\frac{F(x)}{F(a)}\right)^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$ d'où : $G_m(x) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$

De plus : $\forall x > a, G_m(x) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 1$

Et : $G_m(a) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 1$

Donc : $\underline{M_m \xrightarrow{d} 0}$

Q4.a. On a : $M_n(\Omega) \subset]-\infty, a]$ d'où : $(a - M_n)(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$
 D'où : $Z_n(\Omega) \subset \mathbb{R}_+$

Donc :

$$\begin{aligned} \cdot \forall x \in \mathbb{R}^-, M_n(x) &= 0 \\ \cdot \forall x \in \mathbb{R}_+, M_n(x) &= P\left(n(a - M_n) \leq x\right) \\ &= P\left(M_n \geq a - \frac{x}{n}\right) \\ &= 1 - G_n\left(a - \frac{x}{n}\right) \end{aligned}$$

D'où :

$$\forall x \in \mathbb{R}, M_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - \left(\frac{F(a - \frac{x}{n})}{F(a)}\right)^n & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Q4.b. La fonction affine $x \mapsto a+x$ est bien $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et
 $x \mapsto \frac{F(x)}{F(a)}$ aussi

Donc, par composition, $x \mapsto \frac{F(a+x)}{F(a)}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$

Alors, d'après Taylor-Young ^{à l'ordre 1} en a :

$$\begin{aligned} \forall b \in \mathbb{R}, \frac{F(a+x)}{F(a)} &\underset{x \rightarrow b}{=} \frac{F(a+b)}{F(a)} + (x-b) \underbrace{\left(\frac{d}{dt} \frac{F(a+t)}{F(a)}\right)(b)}_{= \frac{f(a+b)}{F(a)}} + o(x-b) \\ &= \frac{f(a+b)}{F(a)} \end{aligned}$$

En particulier, pour $b = 0$, on a :

$$\frac{F(a+x)}{F(a)} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{F(a)}{F(a)} + x \frac{f(a)}{F(a)} + o(x)$$

$\underbrace{\frac{F(a)}{F(a)}}_{=1}$

Où : $\forall x \in \mathbb{R}, \frac{-x}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Donc, par composition, on a : $\forall x \in \mathbb{R}, \frac{F(a - \frac{x}{n})}{F(a)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 - \frac{f(a)}{F(a)} \frac{x}{n} + o\left(\frac{-x}{n}\right)$

Copie anonyme - n°anonymat : 551293

Emplacement
QR Code

Code épreuve : 297

Nombre de pages : 28

Session : 2022

Épreuve de : Mathématiques S EDHEC

Consignes

- Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer
- Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir
- Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite)
- Numéroté chaque page (cadre en bas à droite)
- Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre

$$Qc: \forall x \in \mathbb{R}, o\left(-\frac{x}{n}\right)_{n \rightarrow +\infty} = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \frac{f(a - \frac{x}{n})}{f(a)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1 - \frac{f'(a)}{f(a)} \frac{x}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Qq. B. On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \left(\frac{f(a - \frac{x}{n})}{f(a)}\right)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(1 - \frac{f'(a)}{f(a)} \frac{x}{n}\right)^n$$

Qc :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, -\frac{f'(a)}{f(a)} \frac{x}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$D'au: \forall x \in \mathbb{R}_+, p_n \left(1 - \frac{f'(a)}{f(a)} \frac{x}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{f'(a)}{f(a)} \frac{x}{n}$$

$$\begin{aligned} \text{donc : } n p_n \left(1 - \frac{f'(a)}{f(a)} \frac{x}{n}\right) &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{f'(a)}{f(a)} x \\ &= p_n \left(1 - \frac{f'(a)}{f(a)} \frac{x}{n}\right)^n \end{aligned}$$

Donc, par composition par l'exponentielle, il vient :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}_+, \left(\frac{f(a - \frac{x}{n})}{f(a)}\right)^n &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-\frac{f'(a)}{f(a)} x} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{f'(a)}{f(a)} x} \end{aligned}$$

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R}, H_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{\rho(a)}{F(a)}x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Donc : $Z_n \xrightarrow{d} Z$ avec $Z \hookrightarrow \mathcal{E}\left(\frac{\rho(a)}{F(a)}\right)$

Exercice 2:

Q1. Pour $R = 0$, on a:

$$f \in F \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}^3, \underbrace{\|f(x)\|}_{\geq 0} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}^3, f(x) = 0 \quad (\text{car } \|f(x)\| = 0)$$

Donc:

$$\text{Pour } R = 0, F = \{0_{L(\mathbb{R}^3)}\}$$

Q2.a. On a:

$$A^2 = \frac{1}{27^2} \begin{pmatrix} -1 & 8 & -4 \\ 8 & -1 & -4 \\ -4 & -4 & -7 \end{pmatrix}^2$$

$$= \frac{1}{27^2} \begin{pmatrix} 81 & 0 & 0 \\ 0 & 81 & 0 \\ 0 & 0 & 81 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où: } A^2 = \frac{1}{9} I_3$$

Donc: $X^2 - \frac{1}{9} = (X - \frac{1}{3})(X + \frac{1}{3})$ est un polynôme annulateur non-nul de A

Or, ses racines sont $-\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{3}$, d'où:

$$\underline{\text{sp}(A) \subset \left\{-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right\}}$$

Q2.b. Puisque A est symétrique, d'après le théorème spectral, on a:

A est diagonalisable

Q2.c. A étant symétrique et donc diagonalisable, le théorème spectral nous donne :

les sous-espaces propres de A sont supplémentaires orthogonaux dans $\mathcal{B}_{3,1}(\mathbb{R})$

Or, puisque $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, par écriture matricielle du produit scalaire, on a :

les sous-espaces propres de f sont supplémentaires orthogonaux de $\mathbb{R}^3$

Q2.d. ~~Il existe donc une base $\mathcal{B}' = (x_1, x_2, x_3)$ de $\mathbb{R}^3$ formée de vecteurs propres de f (base orthonormale)~~
 Alors :

~~$$\forall R \in [1, 3], \|f(x_R)\| = \left\| \pm \frac{1}{3} x_R \right\|$$~~

~~$$= \frac{1}{3} \|x_R\|$$~~

~~$$\neq \frac{1}{3} \|x_R\|$$~~

D'où :

~~$$\forall (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3, \|f(y_1, y_2, y_3)\| = \left\| \langle y_1 | x_1 \rangle f(x_1) + \right.$$~~

~~Or (x_1, x_2, x_3) une base de $\mathbb{R}^3$~~

~~$$\text{D'où : } \forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq \frac{1}{3} \|x\|$$~~

~~Donc :~~

~~$f \notin F$~~

Alors : $\forall (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3, (y_1, y_2, y_3) = \langle y_1 | x_1 \rangle x_1 + \langle y_2 | x_2 \rangle x_2 + \langle y_3 | x_3 \rangle x_3$

d'où : $f(y_1, y_2, y_3) = \frac{1}{3} (\pm \langle y_1 | x_1 \rangle x_1 \pm \langle y_2 | x_2 \rangle x_2 \pm \langle y_3 | x_3 \rangle x_3)$

Code épreuve : 297

Nombre de pages : 28

Session : 2022

Épreuve de : Mathématiques S EDHEC

Consignes

- Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer
- Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir
- Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite)
- Numéroté chaque page (cadre en bas à droite)
- Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre

D'ici :

$$\forall (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3, \|f(y_1, y_2, y_3)\|^2 = \frac{1}{3} \|\pm(y_1, x_1)\|^2$$

Q2.d. Puisque $\mathbb{R}^3 = \ker(f - \lambda \text{id}) \oplus \ker(f - \mu \text{id})$, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \exists (y, z) \in \ker(f - \lambda \text{id}) \times \ker(f - \mu \text{id}) / \\ x = y + z \quad \text{d'où : } f(x) = \lambda y + \mu z$$

$$\text{Donc : } \forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| = \|\lambda y + \mu z\|$$

$$= \underbrace{\lambda \|y\|}_{\leq \frac{1}{3}} + \underbrace{\mu \|z\|}_{\leq \frac{1}{3}}$$

théorème de
Pythagore
car $\langle y, z \rangle = 0$

$$\leq \frac{1}{3} (\|y\| + \|z\|)$$

$$= \underbrace{\|y + z\|}_{= x} \quad (\text{Pythagore})$$

$$\text{D'où : } \forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq \frac{1}{3} \|x\|$$

$$\text{Donc : } \underline{f \in F} \quad \text{car } \frac{1}{3} \in [0, 1[$$

Q3.a. Supposons par l'absurde que $\text{Id} \in F$

$$\text{Alors : } \exists R \in [0, 1[\mid \underbrace{\|\text{Id}(x)\|}_{=x} \leq R \underbrace{\|x\|}_{=1}$$

d'où : $\|x\| \leq \|x\|$ ce qui est absurde

Donc :

$$\underline{\text{Id} \notin F}$$

Q3.b. Soit $f \in F$ et $f \neq 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)}$

$$\text{Alors : } \exists R \in]0, 1[\mid \|f(x)\| \leq R \|x\| \quad (R \neq 0 \text{ d'après Q1, car } f \neq 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)})$$

$$\text{Or : } \forall x \in \mathbb{R}^3, \left\| \frac{2}{R} f(x) \right\| \leq 2 \|x\| \text{ et l'égalité est } \begin{array}{l} \text{supposée être} \\ \text{atteinte} \end{array}$$

$$\text{Donc : } \frac{2}{R} f \notin F$$

Donc : F n'est pas un espace vectoriel

Q3.c. Soit $(f, g) \in F \times \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$

$$\text{Alors : } \exists R \in [0, 1[\mid \forall x \in \mathbb{R}^3$$

X

Q3.d. Soit f un automorphisme de F

Donc f non-nulle, f inversible et :

$$\exists R \in]0, 1[\mid \forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq R \|x\| \quad \left(R \neq 0 \begin{array}{l} \text{car sinon} \\ f \text{ est nulle} \end{array} \right)$$

D'où :

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \underbrace{\|f(f^{-1}(x))\|}_{=x} \leq R \|f^{-1}(x)\|$$

$$\text{D'où : } \forall x \in \mathbb{R}^3, \underbrace{\frac{1}{R} \|x\|}_{>1 \text{ car } R \in]0, 1[} \leq \|f^{-1}(x)\|$$

Donc : $f^{-1} \notin F$

Donc :

Si f automorphisme de F alors $f^{-1} \in F$

Q4.a. Soit p un projecteur quelconque de $\mathbb{R}^3$ non-nul

Alors :

$$\forall x \in \text{Im}(p), \|p(x)\| = \|x\|$$

$$\text{Or : } 1 \notin [0, 1[$$

$$\text{Donc : } p \notin F$$

Donc :

F ne contient aucun projecteurs
autres que le projecteur nul (d'après Q1.)

Q4.b. Soit s une symétrie donc s diagonalisable

$$\text{et } \text{sp}(s) = \{-1, 1\}$$

Alors, en reprenant un raisonnement analogue
à Q2.d, en prenant un $x \in \mathbb{R}^3$ quelconque tel que
 $x = y + z$ avec $(y, z) \in \text{Ker}(s + \text{id}) \times \text{Ker}(s - \text{id})$, vu que
 $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(s + \text{id}) \oplus \text{Ker}(s - \text{id})$ (car s diagonalisable,
théorème spectral), on trouvera :

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \|s(x)\| \leq \|x\| \text{ avec égalité pour } x \in \text{Ker}(s + \text{id})$$

$$\text{ou } x \in \text{Ker}(s - \text{id})$$

$$\text{Donc : } s \notin F$$

Donc : F contient aucune symétrie

Q5.a. Puisque f un endomorphisme symétrique, d'après
le théorème spectral, on a $\mathcal{B}' = (x_1, x_2, x_3)$ une base
de $\mathbb{R}^3$ formée de vecteurs propres de f associés aux
valeurs (distinctes ou non) λ_1, λ_2 et λ_3

$$\text{Alors : } \forall k \in [1, 3], \|f(x_k)\| = |\lambda_k| \|x_k\|$$

$$\leq \overbrace{k}^{\in \mathbb{R}} \text{ avec } k = \max_{\lambda \in \text{sp}(f)} |\lambda|$$

Or $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$

Donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq R \|x\| \text{ avec } R = \max_{\lambda \in \text{Sp}(f)} |\lambda|$$

Q5.b. On a :

$$f \in F \Leftrightarrow \exists p \in [0, 1[/ \forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq p \|x\|$$

$$\text{et : } \forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq R \|x\|$$

$$\Leftrightarrow \exists p \in [0, 1[/ \forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq \begin{cases} R \|x\| \\ p \|x\| \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists p \in [0, 1[/ \forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq \begin{cases} R \|x\| \\ p \|x\| \end{cases}$$

et pour x vecteur propre λ tel que $R = |\lambda|$,
 $\|f(x)\| = R \|x\| \leq p \|x\|$

$$\Leftrightarrow \exists p \in [0, 1[/ \forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq p \|x\|$$

et $R \leq p$ (divisé par $\|x\| \neq 0$
vecteur propre de f)

$$\Leftrightarrow R \in [0, 1[\quad (\text{car si } \text{Sp}(f) \subset]-1, 1[, \\ \text{avec Q5.a., l'implication} \\ \text{de gauche à droite} \\ \text{est évidente})$$

Donc :

$$\underline{f \in F \Leftrightarrow \text{Sp}(f) \subset]-1, 1[}$$

Q6.a. On a :

$$A^2 = \frac{1}{36} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2$$

$$= \frac{1}{36} \begin{pmatrix} 8 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

Copie anonyme - n°anonymat : 551293

Emplacement QR Code	Code épreuve : 297	Nombre de pages : 28	Session : 2022
	Épreuve de : Mathématiques S EDMEC		
Consignes • Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer • Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir • Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite) • Numéroté chaque page (cadre en bas à droite) • Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre			

Après :

$$A^3 = \frac{1}{6^3} \begin{pmatrix} 8 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{6^3} \begin{pmatrix} 0 & -18 & 18 \\ -18 & -9 & 0 \\ 18 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$= 9A$$

$$\text{D'où : } A^3 = \frac{1}{24} A$$

Donc : $X^3 - \frac{1}{24}X$ est un polynôme annulateur non-nul de A

Or les racines de $X^3 - \frac{1}{24}X$ sont $-\frac{1}{2\sqrt{6}}$, 0 et $\frac{1}{2\sqrt{6}}$

Donc :

$$\text{sp}(A) \subset \left\{ -\frac{1}{2\sqrt{6}}, 0, \frac{1}{2\sqrt{6}} \right\}$$

Q6.B. Puisque f est un endomorphisme symétrique, f est diagonalisable et :

$$(*) \mathbb{R}^3 = \text{Ker}\left(f + \frac{1}{2\sqrt{6}}\right) \oplus \text{Ker}(f) \oplus \text{Ker}\left(f - \frac{1}{2\sqrt{6}}\right)$$

d'après le théorème spectral

On note que $-\frac{1}{2\sqrt{6}}$ et $\frac{1}{2\sqrt{6}}$ sont forcément valeurs propres de f car sinon 0 est l'unique valeur propre de f ,

ce qui n'est pas possible car $f = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)}$ d'après la matrice A .
 En fait, (*) peut s'écrire plutôt :

$$\mathbb{R}^3 = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \text{Ker}(f - \lambda \text{id}) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} -\frac{1}{2\sqrt{6}} \in \text{Sp}(f) \\ \text{ou } \frac{1}{2\sqrt{6}} \in \text{Sp}(f) \end{cases}$$

Et, d'après Q5.a., on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq \frac{1}{2\sqrt{6}} \|x\| \quad \left(\text{car } \max_{\lambda \in \text{Sp}(f)} |\lambda| = \left| -\frac{1}{2\sqrt{6}} \right| \right)$$

Donc, puisque $\frac{1}{2\sqrt{6}} \in [0, 1]$, on a :

$$f \in F \text{ et } \forall x \in \mathbb{R}^3, \|f(x)\| \leq \frac{1}{2\sqrt{6}} \|x\|$$

Q6.c.



Exercice 3 :

Q1. a. On a $N(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et : $\forall i \in \mathbb{N}^*, X_i(\Omega) = \{0, 1\}$

Donc :

$$\underline{S(\Omega) = \mathbb{N}}$$

Q1. b. On a :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n X_k$ admet une espérance (car $X_1, \dots, X_n$ sont n V.A.P indépendantes admettant une espérance)

Puisque $N(\Omega) = \mathbb{N}^*$, on a bien :

S admet une espérance

Q2. Par somme indépendante et stabilité de la loi Binomiale, on a :

$$\underline{\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p) \text{ et } E(S_n) = np}$$

Q3. la formule des probabilités totales associée au système complet d'événements $((N=n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ nous donne :

$$\begin{aligned} \forall R \in \mathbb{N}^*, P(S=R) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{P(S=R, N=n)} \\ &= \begin{cases} P(S_n=R, N=n) & \text{si } R \leq n \\ 0 & \text{si } R > n \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=R}^{+\infty} P(S_n=R, N=n)$$

Or, pour $(n, R) \in \mathbb{N}^* \times \llbracket 0, n \rrbracket$, $(S_n=R)$ et $(N=n)$ sont indépendants par coalition (N indépendante de $X_1, \dots, X_n$)

Donc :

$$\underline{\forall R \in \mathbb{N}^*, P(S_n=R) = \sum_{n=R}^{+\infty} P(S_n=R) P(N=n)}$$

Q4.a. On a : $N(\Omega) = \mathbb{N}^*$

Alors :

$$\forall R \in \mathbb{N}^*, P(N=R) = P(N-1 = R-1)$$

$$= e^{-\lambda} \frac{\lambda^{R-1}}{(R-1)!}$$

Q4.b. D'après Q3, on a :

$$\forall R \in \mathbb{N}^*, P(S_n = R) = \sum_{m=R}^{+\infty} \binom{m}{R} p^R q^{m-R} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{m-1}}{(m-1)!}$$

$$= \frac{p^R \lambda^{R-1}}{R!} \sum_{m=R}^{+\infty} \frac{m!}{(m-R)!} q^{m-R} \frac{\lambda^{m-R}}{(m-1)!}$$

$$\text{Donc : } \forall R \in \mathbb{N}^*, P(S_n = R) = \frac{p^R \lambda^{R-1}}{R!} \sum_{m=R}^{+\infty} \frac{m(\lambda q)^{m-R}}{(m-R)!}$$

$$\text{Or : } \forall R \in \mathbb{N}^*, \sum_{m=R}^{+\infty} \frac{m(\lambda q)^{m-R}}{(m-R)!} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(m+R)(\lambda q)^m}{m!} \quad (\text{glissement de } R \text{ indices})$$

$$= \lambda q \underbrace{\sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(\lambda q)^{m-1}}{(m-1)!}}_{= e^{\lambda q}} + R \underbrace{\sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(\lambda q)^m}{m!}}_{= e^{\lambda q}}$$

(glissement d'indice)

$$= e^{\lambda q} (\lambda q + R)$$

Donc :

$$\forall R \in \mathbb{N}^*, P(S_n = R) = \frac{p^R \lambda^{R-1}}{R!} (\lambda q + R) e^{\lambda(q-R)}$$

$$\text{Donc : } \forall R \in \mathbb{N}^*, P(S_n = R) = \frac{p^R \lambda^{R-1}}{R!} (\lambda q + R) e^{-\lambda p}$$

Q4.c. Puisque $S(\Omega) = \mathbb{N}$, on a :

$$P(S_n = 0) = 1 - P(S_n \geq 1)$$

$$= 1 - \sum_{R=1}^{+\infty} \frac{p^R \lambda^{R-1}}{R!} (\lambda q + R) e^{-\lambda p}$$

Copie anonyme - n°anonymat : 551293

Emplacement
QR Code

Code épreuve : 297

Nombre de pages : 28

Session : 2022

Épreuve de : Mathématiques S EDNEC

Consignes

- Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer
- Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir
- Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite)
- Numéroté chaque page (cadre en bas à droite)
- Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre

Donc :

$$\begin{aligned} P(S_m = 0) &= 1 - \left(q e^{-\lambda r} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(\lambda r)^k}{k!} + p e^{-\lambda r} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(\lambda r)^{k-1}}{(k-1)!} \right) \\ &= 1 - \left(q e^{-\lambda r} (e^{\lambda r} - 1) + p e^{-\lambda r} e^{\lambda r} \right) \\ &= 1 - (q - q e^{-\lambda r} + p) \end{aligned}$$

Donc :

$$\underline{P(S_m = 0) = q e^{-\lambda r}}$$

Q4. d. On a :

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, E(S | N = m) = E(S_m | N = m)$$

Par indépendance (coalition), on a : $\forall m \in \mathbb{N}^*, E(S_m | N = m) = E(S_m)$

Donc :

$$\underline{\forall m \in \mathbb{N}^*, E(S | N = m) = m p}$$

Alors, d'après la formule de l'espérance totale, on a :

$$\begin{aligned} E(S) &= \sum_{n=1}^{+\infty} E(S | N = n) P(N = n) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n p e^{-\lambda} \frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!} \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
 E(S) &= \sum_{n=1}^{+\infty} (n-1+1) p e^{-\lambda} \frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!} \\
 &= p e^{-\lambda} \lambda \underbrace{\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\lambda^{n-2}}{(n-2)!}}_{= e^{\lambda}} + p e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!}}_{= e^{\lambda}}
 \end{aligned}$$

Donc :

$$\underline{E(S) = p(\lambda + 1)}$$

On : $E(X) = p$ et : $E(N) = E(N-1) + 1$
 $= \lambda + 1$

Donc :

$$\underline{E(S) = E(X)E(N)}$$

Q5.

```

function y = S(lambda, p)
    N = 1 + grand(1, 1, 'poi', lambda)
    y = sum(grand(1, N, 'uin', p))
endfunction

```

Problème :

(Partie 1 :

Q1. Puisque $f(x) \underset{0^+}{\sim} x$ et : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$, f étant continue sur $\mathbb{R}_+^*$, par composition, on a :

$$\underline{P_n(f(x)) \underset{0^+}{\sim} P_n(x)}$$

Q2-a. On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \Delta h(x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2}$$

$$= -\Delta h(x)$$

$$\text{et : } \forall x \in \mathbb{R}, \Delta h(-x) = \frac{e^{-(-x)} + e^x}{2}$$

$$= \Delta h(x)$$

Donc : Δh est impaire (et Δh est paire)

Q2-b. Δh , en tant que somme de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$

Donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \Delta h'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$> 0$$

Donc :

Δh est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

Q2-c. On a : $e^x \underset{0}{=} 1 + x + o(x)$ ($DL_1(0)$ de $\exp$)

$$\text{D'où : } e^x - e^{-x} \underset{0}{=} 1 + x - 1 + x + o(x)$$

$$\text{Donc : } \Delta h(x) \underset{0}{=} x + o(x)$$

et :

$$\Delta h(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$$

$$\Delta h(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$\underline{\Delta h(0) = 0}$$

Donc : $\sinh(x) \sim x$

Q3.a. On a montré à Q2.a. que :

ch est paire

Q3.b. Par somme de fonction $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, ch est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}'(x) = \sinh(x)$$

Puisque sh strictement croissante sur $\mathbb{R}$, le théorème de la bijection nous assure l'unicité du point a tel que $\sinh(a) = 0$

Où : $\sinh(0) = 0$

Donc : ch' est négative sur $\mathbb{R}_-$ et positive sur $\mathbb{R}_+$

Donc :

ch décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et croissante sur $\mathbb{R}_+$

et : $\text{ch}(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} +\infty$ et $\min_{x \in \mathbb{R}} \text{ch}(x) = \text{ch}(0) = 1$

Q4. On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, (\text{ch}(x))^2 - (\sinh(x))^2 = \frac{1}{4} \left(\underbrace{e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x}}_{=1} - \underbrace{e^{2x} + 2e^x e^{-x} - e^{-2x}}_{=1} \right)$$

D'où :

$\forall x \in \mathbb{R}, (\text{ch}(x))^2 - (\sinh(x))^2 = 1$

Copie anonyme - n°anonymat : 551293

Emplacement QR Code	Code épreuve : 297	Nombre de pages : 28	Session : 2022
	Épreuve de : Mathématiques S EDHEC		
Consignes • Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer • Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir • Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite) • Numéroté chaque page (cadre en bas à droite) • Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre			

Partie 2 :

Q5.a. On a ~~ch~~ décroissante sur $\mathbb{R}$ ~~pas croissante sur~~
 $\mathbb{R}_+$ donc

On a ch strictement positive sur $\mathbb{R}$ et continue
sur $\mathbb{R}$, et $x \mapsto \frac{1}{x}$ continue sur $\mathbb{R}^*$

Donc, par composition, $x \mapsto \frac{1}{ch(x)}$ est continue sur $\mathbb{R}$ et
donc bien définie sur $\mathbb{R}$

C'est aussi le cas de sh

Donc, par produit, on a :

th est bien définie (et continue) sur $\mathbb{R}$

Q5.b. On a :

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, th(-x) &= \frac{sh(-x)}{ch(-x)} \\ &= -\frac{sh(x)}{ch(x)} \\ &= -th(x)\end{aligned}$$

Donc : th est impaire

Q5.c. De manière analogue à Q5.a., avec " sh " en lieu et place
de " ch ", on a bien th $\mathbb{R}^*$ sur $\mathbb{R}$

$$\text{D'où : } \forall x \in \mathbb{R}, th'(x) = \frac{sh'(x)ch(x) - sh(x)ch'(x)}{ch(x)^2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{D'où : } \forall x \in \mathbb{R}, \quad h'(x) &= \frac{ch(x)^e - sh(x)^e}{ch(x)^e} \quad (sh' = ch \text{ et } ch' = sh) \\
 &= \frac{1}{ch(x)^e} \quad (\text{d'après Q4.}) \\
 &> 0 \quad (\text{car } ch > 0 \text{ sur } \mathbb{R})
 \end{aligned}$$

Donc :

h est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 \text{Q5-d. On a : } h(0) &= \frac{sh(0)}{ch(0)} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

De plus :


$$\begin{aligned}
 \forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \\
 &= \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Or : } e^{-2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{d'où : } h(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

$$\text{Par imparité de } h, \text{ on a donc : } h(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -1$$

Donc :



Q6. a. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$ fixé et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que :

$$\frac{1}{\sinh(x)} = \frac{ae^{-x}}{1-e^{-x}} + \frac{be^{-x}}{1+e^{-x}}$$

$$\text{donc : } \frac{2}{e^x - e^{-x}} = \frac{ae^{-x}(1+e^{-x}) + be^{-x}(1-e^{-x})}{(1-e^{-x})(1+e^{-x})}$$

$$\text{d'où : } \frac{2e^{-x}}{1-e^{-2x}} = \frac{(a+b)e^{-x} + (a-b)e^{-2x}}{1-e^{-2x}}$$

$$\text{donc : } \begin{cases} a+b = 2 \\ a-b = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \underline{a = 1} \quad \text{et} \quad \underline{b = 1}$$

Q6. b. Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\sinh(x)}$ est $x \mapsto \ln\left(\frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}\right)$

Q7. ~~On a :~~

~~$$\sinh(x) \underset{0^+}{\sim} x \quad \text{et} \quad \cosh(x) \underset{0^+}{\sim} 1$$~~

On a :

$$e^x - e^{-x} \underset{0^+}{\sim} 2x \quad (\text{car } e^x \underset{0^+}{\sim} 1+x+o(x), \text{ raisonnement analogue à Q2.c})$$

$$\text{et : } \frac{e^x + e^{-x}}{2} \underset{0^+}{\sim} 1$$

~~$$\text{D'où : } \sinh(x) \underset{0^+}{\sim} 2x$$~~



Partie 3 :

Q8.a. Soit $k \in \mathbb{N}^*$

Par croissance de Δh , on a :

$$\forall t \in [k, k+1], \Delta h(kx) \leq \Delta h(tx) \leq \Delta h((k+1)x)$$

En passant par l'inverse puis en invoquant la positivité de l'intégrale sur $[k, k+1]$, on a :

$$\begin{aligned} \int_k^{k+1} \frac{1}{\Delta h((k+1)x)} dt &\leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\Delta h(tx)} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\Delta h(kx)} dt \\ &= \frac{1}{\Delta h((k+1)x)} \underbrace{(k+1-k)}_{=1} = \frac{1}{\Delta h(kx)} \underbrace{(k+1-k)}_{=1} \end{aligned}$$

Donc :

$$\underline{\underline{\frac{1}{\Delta h((k+1)x)} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\Delta h(tx)} dt \leq \frac{1}{\Delta h(kx)}}}$$

Q8.b. Par sommation puis par théorème, il vient :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m \frac{1}{\Delta h((k+1)x)} &\leq \int_1^{m+1} \frac{1}{\Delta h(tx)} dt \leq \sum_{k=1}^m \frac{1}{\Delta h(kx)} \\ &= \sum_{k=2}^{m+1} \frac{1}{\Delta h(kx)} \end{aligned}$$

D'où, on soustrait par $\sum_{k=1}^m \frac{1}{\Delta h(kx)} + \int_1^{m+1} \frac{1}{\Delta h(tx)} dx$ puis on multiplie par 1 :

$$\underline{\underline{\int_1^{m+1} \frac{1}{\Delta h(tx)} dt \leq \sum_{k=1}^m \frac{1}{\Delta h(kx)} \leq \int_1^m \frac{1}{\Delta h(tx)} dt}}}$$

Code épreuve : 297

Nombre de pages : 28

Session : 2022

Épreuve de : Mathématiques S EDMEC

Consignes

- Remplir soigneusement l'en-tête de chaque feuille avant de commencer à composer
- Rédiger avec un stylo non effaçable bleu ou noir
- Ne rien écrire dans les marges (gauche et droite)
- Numéroté chaque page (cadre en bas à droite)
- Placer les feuilles A3 ouvertes, dans le même sens et dans l'ordre

Q9-a. D'après Q6-b., on a :

$$\begin{aligned} \int_1^{n+1} \frac{1}{sR(tx)} dt &= \frac{1}{x} \left[\ln \left(\frac{1-e^{-tx}}{1+e^{-tx}} \right) \right]_1^{n+1} \\ &= \frac{1}{x} \left(\ln \left(\frac{1-e^{-(n+1)x}}{1+e^{-(n+1)x}} \right) - \ln \left(\frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}} \right) \right) \\ &\quad \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\substack{\rightarrow 1 \\ \rightarrow 0}} \\ &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\frac{1}{x} \ln \left(\frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}} \right) \end{aligned}$$

Donc : $\int_1^{+\infty} \frac{1}{sR(tx)} dt$ converge

Par comparaison série - intégrale, on a :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{sR(nx)} \text{ converge}$$

NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

