

PARTIE I

- Q1 a) $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ et $x \mapsto e^{x-1}$ est continue et non nulle sur $\mathbb{R}_+^*$; par conséquent f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$e^{x-1} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x; \quad \frac{x}{e^{x-1}} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{e^{x-1}} \right) = 1 = f(0); \quad f \text{ est continue en } 0.$$

c) f est continue sur son domaine de définition $(0, +\infty)$.

b) $f'(x) = \frac{x}{e^{x-1}} - \frac{x}{e^x} = x e^{-x}; \quad \lim_{x \rightarrow 0} (x e^{-x}) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

- Q2 a) $x \mapsto x$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $x \mapsto e^{x-1}$ est dérivable et non nulle sur $\mathbb{R}_+^*$; "par conséquent" f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f'(x) = \frac{1}{(e^{x-1})^2} [e^{x-1} - x e^x].$$

b) $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{x} \left[\frac{x}{e^{x-1}} - 1 \right] = \frac{1}{x(e^{x-1})} (x - e^{x+1}) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-1}{x^{\frac{1}{2}}} (e^x - x - 1).$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2); \quad e^x - x - 1 = \frac{x^2}{2} + o(x^2); \quad e^x - x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2}.$$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \left(\frac{x^2}{2} \right) = -\frac{1}{2}; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\frac{1}{2}.$$

c) f est dérivable en 0 et $f'(0) = -\frac{1}{2}$.

- c) pour l'instant f est continue sur $\mathbb{R}_+$ et f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

$$f'(0) = -\frac{1}{2}.$$

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad f'(x) = \frac{e^{x-1} - x e^x}{(e^{x-1})^2}; \quad f' \text{ est dérivable sur }]0, +\infty[.$$

Par conséquent f est C^1 sur $\mathbb{R}_+$ et par conséquent f' est continue en 0. Autrement dit nous pouvons dire : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x-1} - x e^x}{(e^{x-1})^2} = -\frac{1}{2}$.

Q1) $\forall x \in]0, +\infty[, \quad \frac{e^{x-1} - x e^x}{(e^{x-1})^2} = \frac{e^{x-1} - x}{(e^{x-1})^2} + \frac{x(1 - e^x)}{(e^{x-1})^2} = \frac{e^{x-1} - x}{(e^{x-1})^2} - \frac{x}{e^{x-1}} = \frac{x}{e^{x-1}} \left[\frac{e^{x-1} - x}{x(e^{x-1})} - 1 \right]$

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \frac{e^{x-1} - x e^x}{(e^{x-1})^2} = f(x) \left[\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} - 1 \right]. \quad \text{Avec : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x-1} - x e^x}{(e^{x-1})^2} = 1 \left[\left(-\frac{1}{2} \right) - 1 \right] = -\frac{1}{2}$$

(V2) $\frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2} \underset{0^+}{\sim} \frac{e^x - 1 - xe^x}{x^2}$.

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$; $xe^x = x + x^2 + o(x^2)$

Donc $e^x - 1 - xe^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} - 1 - x - x^2 + o(x^2) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

Pour conclure: $\frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2} \underset{0^+}{\sim} \frac{-x^2/2}{x^2} = -\frac{1}{2}$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2} = -\frac{1}{2}$.

Ceci achève de prouver que : f est C¹ sur]0, +∞[.

(Q3) f est dérivable sur]0, +∞[et $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = -1 + e^x \leq 0$.

f est donc décroissante sur]0, +∞[.

comme $f(0) = 0$, on a: $\forall x \in]0, +\infty[, 0 - x - e^{-x} = f(x) \leq 0$.

et $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = \frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} (1 - e^{-x} - x) = \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} f(x) \leq 0$.

Recap: $\forall x \in]0, +\infty[, f(x) \leq 0$.

(Q4) f est dérivable sur]0, +∞[. $\forall x \in]0, +\infty[, \psi'(x) = 1 + e^x + (x-1)e^x = 1 + xe^x - e^x$

Donc $\forall x \in]0, +\infty[, \psi'(x) = -f'(x) (e^x - 1)^{-1} \geq 0$. // on a aussi $\psi'(x) = e^x (1 - f(x)) \dots !!$

comme $\psi'(0) = 0$: $\forall x \in]0, +\infty[, \psi'(x) \geq 0$. f est croissante sur]0, +∞[.

f est dérivable sur]0, +∞[et $\forall x \in]0, +\infty[, f''(x) = \frac{(e^x - 1 - xe^x)(e^x - 1)^{-2} - 2e^x(e^x - 1)^{-3}(e^x - 1 - xe^x)}{(e^x - 1)^4}$


$\forall x \in]0, +\infty[, f''(x) = \frac{1}{(e^x - 1)^2} [-e^x(x(e^x - 1) + o((e^x - 1 - xe^x)))] = -\frac{e^x}{(e^x - 1)^2} [-x - 2 + (1 + x)e^x]$

$\forall x \in]0, +\infty[, f''(x) = \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} \psi(x)$

Pour conclure: $\forall x \in]0, +\infty[, f''(x) \geq 0$.

Remarque... f est continue sur]0, +∞[et de limite positive sur]0, +∞[; f est donc croissante sur]0, +∞[. On conclut que f est concave sur]0, +∞[.

exercice... Montrer que f est dérivable en 0 et que $f'(0) = 1/2$.



PARTIE II

P.E.N.

Q3 a) $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. $x \mapsto x^p e^{-\lambda x}$ est continue sur $[0, +\infty[$ donc localement intégrable.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(x^p e^{-\lambda x}) = 0$ car $\lambda \in]0, +\infty[$; par conséquent :

$\forall A \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall x \in [A, +\infty[$, $x^2(x^p e^{-\lambda x}) \leq 1$.

Donc $\forall x \in [A, +\infty[$, $0 \leq x^p e^{-\lambda x} \leq \frac{1}{x^2}$.

La convergence de $\int_A^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ et la positivité de $x \mapsto x^p e^{-\lambda x}$ sur $[A, +\infty[$ assurent

la convergence de $\int_A^{+\infty} x^p e^{-\lambda x} dx$ et donc de $\int_0^{+\infty} x^p e^{-\lambda x} dx$.

c1. $K(p, \lambda) = \int_0^{+\infty} x^p e^{-\lambda x} dx$ converge pour tout réel λ strictement positif.

$$K(0, \lambda) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-\lambda x} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[\frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda} \right]_0^A = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda} [1 - e^{-\lambda A}] = \frac{1}{\lambda}.$$

$$\underline{K(0, \lambda) = \frac{1}{\lambda}}.$$

b) Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$

Soit $A \in \mathbb{R}_+^*$. $\int_0^A x^{p+1} e^{-\lambda x} dx = \left[x^{p+1} \frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda} \right]_0^A - \int_0^A (p+1) x^p \left[\frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda} \right] dx$

$$\int_0^A x^{p+1} e^{-\lambda x} dx = -\frac{1}{\lambda} A^{p+1} e^{-\lambda A} + \frac{p+1}{\lambda} \int_0^A x^p e^{-\lambda x} dx. \text{ En faisant tendre } A \text{ vers } +\infty$$

On obtient : $K(p+1, \lambda) = \frac{p+1}{\lambda} K(p, \lambda)$ (car $\lim_{A \rightarrow +\infty} A^{p+1} e^{-\lambda A} = 0$)

c) Soit $\forall p \in \mathbb{N}$, $\frac{K(p+1, \lambda)}{(p+1)!} \overset{\lambda^{p+1}}{=} \frac{K(p, \lambda)}{p!} \lambda^p$. La suite $\left(\frac{K(p, \lambda) \lambda^p}{p!} \right)_{p \geq 0}$ est constante.

Donc $\forall p \in \mathbb{N}$, $\frac{K(p, \lambda) \lambda^p}{p!} = \frac{K(0, \lambda) \lambda^0}{0!} = \frac{1}{\lambda}$.

Finalement : $\forall p \in \mathbb{N}$, $K(p, \lambda) = \frac{p!}{\lambda^{p+1}}$.

Remarque... la récurrence proposée n'était peut-être raisonnable.

Q2) a) noter que : $\forall x \in [0, +\infty[$, $f(x) \leq e^{-x/2}$
 d'égalité et donc pour $x=0$ ($f(0)=1 \leq 1 = e^{-0/2}$)
 Soit $x \in]0, +\infty[$. $f(x) \leq e^{-x/2} \Leftrightarrow x \leq (e^{x/2} - 1)e^{-x/2} \Leftrightarrow 0 \leq e^{x/2} - e^{-x/2} - x$
 $\uparrow$
 $e^x > 0$

considérons la fonction $h: x \mapsto e^{x/2} - e^{-x/2} - x$
 h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $h'(x) = \frac{1}{2}(e^{x/2} + e^{-x/2}) - 1 = \frac{1}{2}(e^{x/2} + e^{-x/2} - 2) = \frac{(e^{x/4} - e^{-x/4})^2}{2} \geq 0$.

h est croissante sur $\mathbb{R}$ et $h(0) = 0$. Par conséquent : $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $h(x) \geq 0$

En particulier : $\forall x \in]0, +\infty[$, $0 \leq e^{x/2} - e^{-x/2} - x$

Ceci achève de prouver que : $\forall x \in [0, +\infty[$, $f(x) \leq e^{-x/2}$.

b) $x \mapsto x^p f(x)$ est continue sur $[0, +\infty[$ et positive. En particulier cette fonction est localement intégrable sur $[0, +\infty[$.

$f(x) \sim_{x \rightarrow 0} x e^{-x}$; $x^p f(x) \sim_{x \rightarrow 0} x^{p+1} e^{-x}$. D'après II Q3 a) : $\int_0^{+\infty} x^{p+1} e^{-x} dx$ converge;

la positivité de f assure alors la convergence de $\int_0^{+\infty} x^p f(x) dx$.

▼ Remarque .. on pourrait aussi utiliser : $\forall x \in [0, +\infty[$, $0 \leq x^p f(x) \leq x^p e^{-x/2}$ ▼

Q3) a) la série de terme général $\frac{1}{e^{kx}}$ converge car $p+1 > 1$ (... Riemann).

b) Soit $x \in]0, +\infty[$ et $n \in \mathbb{N}^*$

$$\sum_{k=1}^n e^{-kx} = e^{-x} \sum_{k=1}^n (e^{-x})^{k-1} \quad \begin{matrix} e^{-x} = \frac{1}{e^x} \\ \uparrow \\ e^{-x} \neq 1 \end{matrix} \quad \frac{1 - (e^{-x})^n}{1 - e^{-x}} = \frac{1 - e^{-nx}}{e^x - 1} = \frac{1}{e^x - 1} - \frac{e^{-nx}}{e^x - 1}$$

$$\text{Donc : } \underline{\underline{\frac{1}{e^x - 1} = \sum_{k=1}^n e^{-kx} + \frac{e^{-nx}}{e^x - 1}}}, \text{ pour tout } x \text{ dans }]0, +\infty[\text{ et } n \text{ dans } \mathbb{N}^*.$$

c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $x \in]0, +\infty[$.

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 1} = \sum_{k=1}^n x e^{-kx} + \frac{x e^{-nx}}{e^x - 1} = \sum_{k=1}^n x e^{-kx} + f(x) e^{-nx}$$

$$\underline{\underline{f(x) = \sum_{k=1}^n x e^{-kx} + f(x) e^{-nx} \dots}} \text{ égalité qui vaut pour } 0.$$

Donc : $\forall x \in]0, +\infty[$, $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x e^{-kx} + f(x) e^{-nx}$.

$\int_0^{+\infty} f(x) dx$ converge, $\int_0^{+\infty} x e^{-kx} dx$ aussi et ceci pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Ceci suffit alors pour obtenir : $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_0^{+\infty} x e^{-kx} dx + \int_0^{+\infty} f(x) e^{-nx} dx$.

(la convergence de la dernière intégrale est assurée par la convergence des intégrales qui la précèdent !)

II.9.1.2

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \int_0^{+\infty} x e^{-kx} dx = \frac{1!}{k^{1+1}} = \frac{1}{k^2}.$$

$$\text{donc } I_0 = \int_0^{+\infty} f(x) dx = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} + \int_0^{+\infty} f(x) e^{-nx} dx \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*.$$

d) $\forall x \in]0, +\infty[$, $0 \leq f(x) e^{-nx} \leq e^{-\frac{x}{2}} e^{-nx} = e^{-(n+\frac{1}{2})x}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

d'après II.9.1.1) $\int_0^{+\infty} e^{-(n+\frac{1}{2})x} dx = \frac{1}{n+\frac{1}{2}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Par conséquent : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq \int_0^{+\infty} f(x) e^{-nx} dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-(n+\frac{1}{2})x} dx = \frac{1}{n+\frac{1}{2}}$.

de même d'accroissement nulle alors que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f(x) e^{-nx} dx = 0$.

Ceci suffit pour dire alors que : $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = I_0 = \int_0^{+\infty} f(x) dx$.

Finalement : $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx$ ou $I_0 = A_0$.

e) soit $n \in \mathbb{N}^*$. $\forall x \in]0, +\infty[$, $f(x) = \sum_{k=1}^n x e^{-kx} + f(x) e^{-nx}$.

Donc $\forall x \in]0, +\infty[$, $x^p f(x) = \sum_{k=1}^n x^{p+1} e^{-kx} + x^p f(x) e^{-nx}$.

$\int_0^{+\infty} x^p f(x) dx$ converge ainsi que $\int_0^{+\infty} x^{p+1} e^{-kx} dx$ et ceci pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Il vient alors en intégrant la dernière égalité : $\int_0^{+\infty} x^p f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_0^{+\infty} x^{p+1} e^{-kx} dx + \int_0^{+\infty} x^p f(x) e^{-nx} dx$.

$$\int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} g(t) dt - \frac{1}{2} \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} (t-x-\frac{1}{2})^2 g''(t) dt - \frac{1}{2} \int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x+\frac{1}{2})^2 g''(t) dt = \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} g(t) dt + \frac{1}{8} g'(x) + \frac{1}{2} g(x) - \int_{x-\frac{1}{2}}^x g(t) dt - \frac{1}{8} g'(x) \\ + \frac{1}{2} g(x) - \int_{x-\frac{1}{2}}^x g(t) dt = \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} g(t) dt + g(x) - \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} g(t) dt = g(x). \text{ Finalement:}$$

$$g(x) = \int_{x-\frac{1}{2}}^x g(t) dt - \frac{1}{2} \int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x-\frac{1}{2})^2 g''(t) dt - \frac{1}{2} \int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x+\frac{1}{2})^2 g''(t) dt.$$

b) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Appliquons le résultat précédent à $g: t \mapsto \frac{1}{t^{p+4}}$ sur $[k-\frac{1}{2}, k+\frac{1}{2}]$.
 g est C^2 sur $[k-\frac{1}{2}, k+\frac{1}{2}]$ et $\forall t \in [k-\frac{1}{2}, k+\frac{1}{2}], g''(t) = \frac{(p+4)(p+5)}{t^{p+6}}$.

Il vient alors: $g(k) = \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} g(t) dt - \frac{1}{2} \int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k-\frac{1}{2})^2 g''(t) dt - \frac{1}{2} \int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k+\frac{1}{2})^2 g''(t) dt$, c'est à dire:

$$\frac{1}{k^{p+4}} = \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+4}} - \frac{1}{2} \int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k-\frac{1}{2})^2 \frac{(p+4)(p+5)}{t^{p+6}} dt - \frac{1}{2} \int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k+\frac{1}{2})^2 \frac{(p+4)(p+5)}{t^{p+6}} dt ; \text{ par conséquent:}$$

$$\left| \frac{1}{k^{p+4}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+4}} \right| \leq \frac{1}{2} \int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k-\frac{1}{2})^2 \frac{(p+4)(p+5)}{t^{p+6}} dt + \frac{1}{2} \int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k+\frac{1}{2})^2 \frac{(p+4)(p+5)}{t^{p+6}} dt.$$

Remarque: $\forall t \in [k, k+\frac{1}{2}], 0 \leq (t-k-\frac{1}{2})^2 \frac{(p+4)(p+5)}{t^{p+6}} \leq (t-k-\frac{1}{2})^2 \frac{(p+4)(p+5)}{k^{p+6}} \leq (t-k-\frac{1}{2})^2 \frac{(p+4)(p+5)}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}}$

et $\forall t \in [k-\frac{1}{2}, k], 0 \leq (t-k+\frac{1}{2})^2 \frac{(p+4)(p+5)}{t^{p+6}} \leq (t-k+\frac{1}{2})^2 \frac{(p+4)(p+5)}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}}$.

On a donc alors: $\left| \frac{1}{k^{p+4}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+4}} \right| \leq \frac{1}{2} \frac{(p+4)(p+5)}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \left[\int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k-\frac{1}{2})^2 dt + \int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k+\frac{1}{2})^2 dt \right].$

or: $\int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k-\frac{1}{2})^2 dt = \left[\frac{(t-k-\frac{1}{2})^3}{3} \right]_{k-\frac{1}{2}}^k = 0 - \frac{(-\frac{1}{2})^3}{3} = \frac{1}{24}$

$\int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k+\frac{1}{2})^2 dt = \left[\frac{(t-k+\frac{1}{2})^3}{3} \right]_{k-\frac{1}{2}}^k = \frac{(\frac{1}{2})^3}{3} - 0 = \frac{1}{24}$.

Donc $\left| \frac{1}{k^{p+4}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+4}} \right| \leq \frac{1}{2} \frac{(p+4)(p+5)}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \left[\frac{1}{24} + \frac{1}{24} \right]$. Finalement:

$$\left| \frac{1}{k^{p+4}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+4}} \right| \leq \frac{(p+4)(p+5)}{24 (k-\frac{1}{2})^{p+6}}$$

▼ Exercice .. Retrouver le résultat en "4 lignes" en appliquant l'inégalité de T.L. à une primitive de $t \mapsto \frac{1}{t^{p+4}}$, à l'ordre 2 sur $[k, k+\frac{1}{2}]$ et $["k, k-\frac{1}{2}"]$. Voir à la fin.

c) $u: t \mapsto \frac{1}{(t-\frac{1}{2})^{p+4}}$ est continue et positive sur $[1, +\infty[$.

de plus $u(t) \sim \frac{1}{t^{p+4}}$. Comme $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{p+4}}$ converge, la positivité de u assure la convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^{p+4}} = \int_1^{+\infty} u(t) dt$;

u étant décroissante, positive et continue : la série de terme général $u(k) = \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+4}}$ converge puisque $\int_1^{+\infty} u(t) dt$ converge.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $q \in [n+1, +\infty[$

décroissance de u sur $[k-1, k]$

$$\forall k \in [n+1, q], u(k) = (k - (k-1)) u(k) = \int_{k-1}^k u(t) dt \leq \int_{k-1}^k u(t) dt$$

$$\text{donc } \sum_{k=n+1}^q u(k) \leq \sum_{k=n+1}^q \int_{k-1}^k u(t) dt = \int_n^q u(t) dt$$

Par passage à la limite il vient : $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+4}} \leq \int_n^{+\infty} \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^{p+4}}$

$$\int_n^{+\infty} \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^{p+4}} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_n^A \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^{p+4}} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[\frac{(t-\frac{1}{2})^{-p-3}}{-p-3} \right]_n^A = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[\frac{(A-\frac{1}{2})^{-p-3}}{-p-3} - \frac{(n-\frac{1}{2})^{-p-3}}{-p-3} \right]$$

$$\text{donc } \int_n^{+\infty} \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^{p+4}} = \frac{1}{p+3} \wedge \frac{1}{(n-\frac{1}{2})^{p+3}}$$

Finalement : $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+4}} \leq \frac{1}{(p+3)(n-\frac{1}{2})^{p+3}} \quad \textcircled{*}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $q \in [n+1, +\infty[$.

$$\left| \sum_{k=n+1}^q \left(\frac{1}{k^{p+4}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+4}} \right) \right| \leq \sum_{k=n+1}^q \left| \frac{1}{k^{p+4}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+4}} \right| \leq \sum_{k=n+1}^q \frac{(p+4)(p+3)}{24(k-\frac{1}{2})^{p+4}}$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^q \frac{1}{k^{p+4}} - \int_{n+\frac{1}{2}}^{q+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+4}} \right| \leq \frac{(p+4)(p+3)}{24} \sum_{k=n+1}^q \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+4}} \leq \frac{(p+4)(p+3)}{24} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+4}}$$

donc : $\left| \sum_{k=n+1}^q \frac{1}{k^{p+4}} - \int_{n+\frac{1}{2}}^{q+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+4}} \right| \leq \frac{(p+4)(p+3)}{24} \wedge \frac{1}{p+3} \frac{1}{(n-\frac{1}{2})^{p+3}} = \frac{p+4}{24} \frac{1}{(n-\frac{1}{2})^{p+3}} \quad \textcircled{*}$

Ne reste plus qu'à faire tendre $q \rightarrow +\infty$, mais avant calculer $\int_{n+\frac{1}{2}}^{q+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}}$

$$\int_{n+\frac{1}{2}}^{q+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}} = \left[-\frac{t^{-p-1}}{p+1} \right]_{n+\frac{1}{2}}^{q+\frac{1}{2}} = \frac{1}{p+1} \left[\frac{1}{(n+\frac{1}{2})^{p+1}} - \frac{1}{(q+\frac{1}{2})^{p+1}} \right]$$

En particulier : $\lim_{q \rightarrow +\infty} \int_{n+\frac{1}{2}}^{q+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}} = \frac{1}{(p+1)(n+\frac{1}{2})^{p+1}}$

Finalement : $\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+2}} - \frac{1}{(p+1)(n+\frac{1}{2})^{p+1}} \right| \leq \frac{p+2}{24(n-\frac{1}{2})^{p+3}}$

Lequel s'écrit mieux : $\left| A_p - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{p+2}} - \frac{1}{(p+1)(n+\frac{1}{2})^{p+1}} \right| \leq \frac{p+2}{24(n-\frac{1}{2})^{p+3}}$

Donc $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{p+2}} + \frac{1}{(p+1)(n+\frac{1}{2})^{p+1}}$ est une valeur approchée de A_p à $\frac{p+2}{24(n-\frac{1}{2})^{p+3}}$ près.

et pour $p=2$

$$|A_2 - u_n| = \left| A_2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4} - \frac{1}{3(n+\frac{1}{2})^3} \right| \leq \frac{4}{24(n-\frac{1}{2})^5} = \frac{1}{6(n-\frac{1}{2})^5}$$

$$|A_2 - u_n| \leq \frac{1}{6(n-\frac{1}{2})^5}$$

Pour avoir $|A_2 - u_n| \leq 10^{-6}$ il suffit d'avoir $\frac{1}{6(n-\frac{1}{2})^5} \leq 10^{-6}$ c'est-à-dire

$$n - \frac{1}{2} \geq \left(\frac{10^6}{6} \right)^{1/5} \text{ ou encore } n \geq \frac{1}{2} + \left(\frac{10^6}{6} \right)^{1/5}$$

$$\frac{1}{2} + \left(\frac{10^6}{6} \right)^{1/5} \approx 11,58$$

u_{12} est une valeur approchée de A_2 à 10^{-6} près.

▼ Remarque 1.. $u_{12} \approx 1,082\ 323\ 777$ et $A_2 = \frac{\pi^4}{90} \approx 1,082\ 323\ 234$

2.. Nous ne sommes pas en mesure ici de trouver la valeur minimale de n

telle que : $|A_2 - u_n| \leq 10^{-6}$ avec la seule adjonction de $\leq$! Avec $A_2 = \frac{\pi^4}{90}$ à trouver pour valeur minimale !!

② deuxième approximation!! Ici on a 3 TL donc le résultat a 6 lignes!

$$\textcircled{0} \int_x^{x+\frac{1}{2}} \underbrace{(t-x-\frac{1}{2})^4}_{\substack{u \\ u'}} g^{(4)}(t) dt = \left[\underbrace{(t-x-\frac{1}{2})^4}_{u'} g^{(3)}(t) \right]_x^{x+\frac{1}{2}} - \int_x^{x+\frac{1}{2}} 4 \underbrace{(t-x-\frac{1}{2})^3}_{u'} g^{(3)}(t) dt = -\frac{1}{16} g^{(3)}(x) - 4 \int_x^{x+\frac{1}{2}} \underbrace{(t-x-\frac{1}{2})^3}_{u'} \underbrace{g^{(3)}(t)}_{u'} dt;$$

$$\int_x^{x+\frac{1}{2}} (t-x-\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt = -\frac{1}{16} g^{(3)}(x) - 4 \left[\underbrace{(t-x-\frac{1}{2})^3}_{u'} g^{(3)}(t) \right]_x^{x+\frac{1}{2}} + 4 \int_x^{x+\frac{1}{2}} 3 \underbrace{(t-x-\frac{1}{2})^2}_{u'} g^{(3)}(t) dt;$$

$$\int_x^{x+\frac{1}{2}} (t-x-\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt = -\frac{1}{16} g^{(3)}(x) - \frac{1}{2} g^{(2)}(x) + 12 \int_x^{x+\frac{1}{2}} \underbrace{(t-x-\frac{1}{2})^2}_{u'} g^{(3)}(t) dt.$$

Noter pour en venir à donner la valeur de la dernière intégrale sans nouveaux calculs... mais attendons. Le même:

$$\int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x+\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt = \left[\underbrace{(t-x+\frac{1}{2})^4}_{u'} g^{(3)}(t) \right]_{x-\frac{1}{2}}^x - \int_{x-\frac{1}{2}}^x 4 \underbrace{(t-x+\frac{1}{2})^3}_{u'} g^{(3)}(t) dt = \frac{1}{16} g^{(3)}(x) - 4 \int_{x-\frac{1}{2}}^x \underbrace{(t-x+\frac{1}{2})^3}_{u'} \underbrace{g^{(3)}(t)}_{u'} dt;$$

$$= \frac{1}{16} g^{(3)}(x) - 4 \left[\underbrace{(t-x+\frac{1}{2})^3}_{u'} g^{(3)}(t) \right]_{x-\frac{1}{2}}^x + 4 \int_{x-\frac{1}{2}}^x 3 \underbrace{(t-x+\frac{1}{2})^2}_{u'} g^{(3)}(t) dt;$$

$$\int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x+\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt = \frac{1}{16} g^{(3)}(x) - \frac{1}{2} g^{(2)}(x) + 12 \int_{x-\frac{1}{2}}^x \underbrace{(t-x+\frac{1}{2})^2}_{u'} g^{(3)}(t) dt.$$

Pour conclure:

$$\frac{1}{24} \left[\int_x^{x+\frac{1}{2}} (t-x-\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt + \int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x+\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt \right] = -\frac{1}{24} g^{(3)}(x) + \frac{1}{2} \left[\int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x+\frac{1}{2})^2 g^{(3)}(t) dt + \int_x^{x+\frac{1}{2}} (t-x-\frac{1}{2})^2 g^{(3)}(t) dt \right]$$

le résultat de III 93 donne alors:

$$\frac{1}{2} \left[\int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x+\frac{1}{2})^2 g^{(3)}(t) dt + \int_x^{x+\frac{1}{2}} (t-x-\frac{1}{2})^2 g^{(3)}(t) dt \right] = \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} g(t) dt - g(x).$$

$$\text{On dit est donc: } \frac{1}{24} \left[\int_x^{x+\frac{1}{2}} (t-x-\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt + \int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x+\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt \right] = -\frac{1}{24} g^{(3)}(x) + \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} g(t) dt - g(x).$$

à qui on a fini donc:

$$g(x) = \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} g(t) dt - \frac{1}{24} g^{(3)}(x) - \frac{1}{24} \left(\int_x^{x+\frac{1}{2}} (t-x-\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt + \int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x+\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt \right).$$

$$\text{Ex.: } g^{(4)} \text{ donc: } g(x) = \int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} g(t) dt - \sum_{k=1}^{Q-1} \frac{1}{2^k (k+1)!} g^{(k)}(x) - \frac{1}{(Q)!} \left[\int_x^{x+\frac{1}{2}} (t-x-\frac{1}{2})^Q g^{(Q+1)}(t) dt + \int_{x-\frac{1}{2}}^x (t-x+\frac{1}{2})^Q g^{(Q+1)}(t) dt \right]$$

b) soit $k \in \mathbb{N}^*$. Appliquons le résultat précédent à $g: t \mapsto \frac{1}{t^{p+2}}$ sur $[k-\frac{1}{2}, k+\frac{1}{2}]$.

$$g \text{ est } C^4 \text{ sur } [k-\frac{1}{2}, k+\frac{1}{2}], \forall t \in [k-\frac{1}{2}, k+\frac{1}{2}], g'(t) = \frac{(p+1)(p+3)}{t^{p+3}} \text{ et } g^{(4)}(t) = \frac{(p+1)(p+3)(p+4)(p+5)}{t^{p+6}}$$

$$\text{Donc } \frac{1}{k^{p+2}} = g(k) = \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} g(t) dt - \frac{g''(k)}{24} - \frac{1}{24} \left[\int_k^{k+\frac{1}{2}} (t-k-\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt + \int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k+\frac{1}{2})^4 g^{(4)}(t) dt \right] \text{ c'est à dire}$$

$$\text{que: } \frac{1}{k^{p+2}} = \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{1}{t^{p+2}} dt - \frac{(p+1)(p+3)}{24 k^{p+4}} - \frac{1}{24} \left(\int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{(t-k-\frac{1}{2})^4 (p+1)(p+3)(p+4)(p+5)}{t^{p+6}} dt + \int_{k-\frac{1}{2}}^k \frac{(t-k+\frac{1}{2})^4 (p+1)(p+3)(p+4)(p+5)}{t^{p+6}} dt \right)$$

$$\left| \frac{1}{k^{p+2}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{1}{t^{p+2}} dt + \frac{(p+1)(p+3)}{24 k^{p+4}} \right| = \frac{(p+1)(p+3)(p+4)(p+5)}{24} \left| \int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{(t-k-\frac{1}{2})^4}{t^{p+6}} dt + \int_{k-\frac{1}{2}}^k \frac{(t-k+\frac{1}{2})^4}{t^{p+6}} dt \right|$$

$$\text{Notons que: } \begin{cases} \forall t \in [k, k+\frac{1}{2}], \text{ on } \frac{(t-k-\frac{1}{2})^4}{t^{p+6}} \leq \frac{(t-k-\frac{1}{2})^4}{k^{p+6}} \leq \frac{(t-k-\frac{1}{2})^4}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \\ \forall t \in [k-\frac{1}{2}, k], \text{ on } \frac{(t-k+\frac{1}{2})^4}{t^{p+6}} \leq \frac{(t-k+\frac{1}{2})^4}{k^{p+6}} \leq \frac{(t-k+\frac{1}{2})^4}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \end{cases}$$

$$\text{Donc } \left| \int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{(t-k-\frac{1}{2})^4}{t^{p+6}} dt + \int_{k-\frac{1}{2}}^k \frac{(t-k+\frac{1}{2})^4}{t^{p+6}} dt \right| \leq \int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{(t-k-\frac{1}{2})^4}{k^{p+6}} dt + \int_{k-\frac{1}{2}}^k \frac{(t-k+\frac{1}{2})^4}{k^{p+6}} dt \leq \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \left[\int_k^{k+\frac{1}{2}} (t-k-\frac{1}{2})^4 dt + \int_{k-\frac{1}{2}}^k (t-k+\frac{1}{2})^4 dt \right]$$

$$\text{ou: } \left| \int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{(t-k-\frac{1}{2})^4}{t^{p+6}} dt + \int_{k-\frac{1}{2}}^k \frac{(t-k+\frac{1}{2})^4}{t^{p+6}} dt \right| \leq \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \left(\left[\frac{(t-k-\frac{1}{2})^5}{5} \right]_k^{k+\frac{1}{2}} + \left[\frac{(t-k+\frac{1}{2})^5}{5} \right]_{k-\frac{1}{2}}^k \right)$$

$$\leq \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \left(-\frac{(\frac{1}{2})^5}{5} + \frac{(\frac{1}{2})^5}{5} \right) = \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \times \frac{2}{2^5 \times 5} = \frac{1}{80(k-\frac{1}{2})^{p+6}}$$

Notons pour conclure.

$$\left| \frac{1}{k^{p+2}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{1}{t^{p+2}} dt + \frac{(p+1)(p+3)}{24 k^{p+4}} \right| \leq \frac{(p+1)(p+3)(p+4)(p+5)}{24} \times \frac{1}{80(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \text{ ou:}$$

$$\left| \frac{1}{k^{p+2}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{1}{t^{p+2}} dt + \frac{(p+1)(p+3)}{24 k^{p+4}} \right| \leq \frac{(p+1)(p+3)(p+4)(p+5)}{1920(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \text{ pour tout } k \in \mathbb{N}^*.$$

c) Ne reste plus qu'à sommer de $n=1$ à $+\infty$ et à trouver un majorant du majorant !
commençons par cela.

▼ $v: t \mapsto \frac{1}{(t-\frac{1}{2})^{p+6}}$ est continue, positive et décroissante sur $(3, +\infty[$

la série de terme général $v(k)$ et de même nature que $\int_1^{+\infty} v(t) dt$

la $v(t) \sim \frac{1}{t^{p+6}}$. La convergence de $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{p+6}}$ ($p+6 > 1$ - Riemann!) et la positivité de v

montrent la convergence de $\int_1^{+\infty} v(t) dt$ et la convergence de la série de terme général $v(k)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $q \in \mathbb{N}$, $q \geq n$ et $q \in \mathbb{N}$

$$v(k) \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}, \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^6} = v(k) = \int_{k-1}^k v(t) dt \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^{p+6}}$$

$$\text{donc } \sum_{k=n+1}^q \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^6} \leq \sum_{k=n+1}^q \int_{k-1}^k \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^{p+6}} = \int_n^q \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^{p+6}} = -\frac{1}{p+5} \left[\frac{1}{(t-\frac{1}{2})^{p+5}} \right]_n^q = \frac{1}{p+5} \left[\frac{1}{(n-\frac{1}{2})^{p+5}} - \frac{1}{(q-\frac{1}{2})^{p+5}} \right]$$

En faisant tendre q vers $+\infty$ il vient :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}} \leq \frac{1}{p+5} \frac{1}{(n-\frac{1}{2})^{p+5}}$$

▼ Remarque... la positivité obtenue directement le résultat en remplaçant p par $p+2$ dans la première inégalité de III a. c. !. ▼

$$\left| \sum_{k=n+1}^q \left(\frac{1}{k^{p+6}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+6}} + \frac{(p+1)(p+3)}{24 k^{p+4}} \right) \right| \leq \sum_{k=n+1}^q \left| \frac{1}{k^{p+6}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+6}} + \frac{(p+1)(p+3)}{24 k^{p+4}} \right| \leq \sum_{k=n+1}^q \frac{(p+1)(p+3)(p+4)(p+5)}{1920 (k-\frac{1}{2})^{p+6}}$$

$$\text{donc } \left| \sum_{k=n+1}^q \frac{1}{k^{p+6}} - \int_{n+\frac{1}{2}}^{q+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+6}} + \frac{(p+1)(p+3)}{24} \sum_{k=n+1}^q \frac{1}{k^{p+4}} \right| \leq \frac{(p+1)(p+3)(p+4)(p+5)}{1920} \sum_{k=n+1}^q \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}}$$

Noter que : $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+6}}$, $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+4}}$ et $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}}$ existent.

$$\text{de plus } \lim_{q \rightarrow +\infty} \int_{n+\frac{1}{2}}^{q+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+6}} = \lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{1}{p+5} \left[\frac{1}{(n+\frac{1}{2})^{p+5}} - \frac{1}{(q+\frac{1}{2})^{p+5}} \right] = \frac{1}{(p+1)(n+\frac{1}{2})^{p+5}}$$

En faisant tendre q vers $+\infty$ dans la dernière inégalité et en ajoutant $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(k-\frac{1}{2})^{p+6}}$ par $\frac{1}{p+5} \frac{1}{(n-\frac{1}{2})^{p+5}}$ il vient :

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+6}} - \frac{1}{(p+1)(n+\frac{1}{2})^{p+5}} + \frac{(p+1)(p+3)}{24} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+4}} \right| \leq \frac{(p+1)(p+3)(p+4)}{1920 (n-\frac{1}{2})^{p+5}}$$

$$|A_p \cdot U_n| = \left| \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+2}} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{p+2}} - \frac{1}{(p+1)(n+\frac{1}{2})^{p+1}} + \frac{p+2}{24(n+\frac{1}{2})^{p+3}} \right|$$

$$|A_p \cdot U_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+2}} - \frac{1}{(p+1)(n+\frac{1}{2})^{p+1}} + \frac{(p+2)(p+3)}{24} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+4}} - \frac{(p+1)(p+2)}{24} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+4}} + \frac{(p+1)}{24(n+\frac{1}{2})^{p+3}} \right|$$

$$|A_p \cdot U_n| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+2}} - \frac{1}{(p+1)(n+\frac{1}{2})^{p+1}} + \frac{(p+1)(p+3)}{24} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+4}} \right| + \frac{(p+2)(p+3)}{24} \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+4}} - \frac{1}{(p+3)(n+\frac{1}{2})^{p+3}} \right|$$

$$|A_p \cdot U_n| \leq \underbrace{\frac{(p+1)(p+3)(p+4)}{5760(n+\frac{1}{2})^{p+5}}}_{\text{III 2.C}} + \underbrace{\frac{(p+2)(p+3)}{24} \frac{(p+4)}{24(n+\frac{1}{2})^{p+5}}}_{\text{III 3.C}} = \frac{13}{5760} \frac{(p+1)(p+3)(p+4)}{(n+\frac{1}{2})^{p+5}}$$

III 3.C on remplace p par p+2 dans la dernière inégalité de la page 3

$$\text{Donc } |A_p \cdot U_n| \leq \frac{13}{5760} \frac{(p+1)(p+3)(p+4)}{(n+\frac{1}{2})^{p+5}}$$

e) Exemple.. p=0. Alors $|A_0 \cdot U_n| \leq \frac{13}{240} \frac{1}{(n+\frac{1}{2})^5}$

$$\frac{13}{240} \frac{1}{(n+\frac{1}{2})^5} \leq 10^{-6} \Leftrightarrow n+\frac{1}{2} \geq \left(\frac{13 \times 10^6}{240} \right)^{\frac{1}{5}} \Leftrightarrow n \geq \frac{1}{2} + \left(\frac{13 \times 10^6}{240} \right)^{\frac{1}{5}}$$

$$\frac{1}{2} + \left(\frac{13 \times 10^6}{240} \right)^{\frac{1}{5}} \approx 9,35.$$

V_{30} est une valeur approchée de $A_0 \approx 10^{-6} \text{ p.u.}$

p=2. Alors $|A_2 \cdot U_n| \leq \frac{13}{48} \frac{1}{(n+\frac{1}{2})^7}$

$$\frac{13}{48} \frac{1}{(n+\frac{1}{2})^7} \leq 10^{-6} \Leftrightarrow n \geq \frac{1}{2} + \left(\frac{13 \times 10^6}{48} \right)^{\frac{1}{7}} \quad \& \quad \frac{1}{2} + \left(\frac{13 \times 10^6}{48} \right)^{\frac{1}{7}} \approx 6,47$$

V_7 est une valeur approchée de $A_2 \approx 10^{-6} \text{ p.u.}$

Remarques 1. La fonction Gamma est, $\Gamma: x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

La fonction zêta est, $\zeta: x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$

Notons que Γ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ et ζ sur $]1, +\infty[$.

$\forall p \in \mathbb{N}^*$, $\Gamma(p) = (p-1)!$

À la partie II nous avons obtenu: $\forall p \in \mathbb{N}$, $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p+1}}{e^x - 1} dx = (p+1)! \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+2}}$

Ceci s'écrit encore: $\forall p \in \mathbb{N}$, $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p+1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(p+2) \zeta(p+2)$ ou:

$\forall p \in]1, +\infty[$ $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(p) \zeta(p)$. On généralise et on peut écrire que:

$\forall \alpha \in]1, +\infty[$, $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(\alpha) \zeta(\alpha)$. (voir les exercices sur les intégrales généralisées).

2.. Retournons le résultat de III Q1 à quelques lignes. Soit G une primitive sur $\mathbb{R}_+^*$

de $g: t \mapsto \frac{1}{t^{p+2}}$. Soit C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$ et: $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $G'(t) = g(t) = \frac{1}{t^{p+2}}$, $G''(t) = -\frac{p+2}{t^{p+3}}$ et $G'''(t) = \frac{(p+2)(p+3)}{t^{p+4}}$

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. L'inégalité de Taylor-Lagrange appliquée à G , à l'ordre 2

sur $[k, k+\frac{1}{2}]$ donne: $|G(k+\frac{1}{2}) - G(k) - (k+\frac{1}{2}-k)G'(k) - \frac{(k+\frac{1}{2}-k)^2}{2} G''(k)| \leq \frac{(k+\frac{1}{2}-k)^3}{3!} \max_{t \in [k, k+\frac{1}{2}]} |G'''(t)|$ (1)

sur $[k, k-\frac{1}{2}]$ donne: $|G(k-\frac{1}{2}) - G(k) - (k-\frac{1}{2}-k)G'(k) - \frac{(k-\frac{1}{2}-k)^2}{2} G''(k)| \leq \frac{(k-\frac{1}{2}-k)^3}{3!} \max_{t \in [k, k-\frac{1}{2}]} |G'''(t)|$ (2)

On ajoute que: $|\int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}} - \frac{1}{2k^{p+2}} - \frac{1}{8} G''(k)| \leq \frac{1}{48} \max_{t \in [k, k+\frac{1}{2}]} \frac{(p+2)(p+3)}{t^{p+4}} = \frac{(p+2)(p+3)}{48(k)^{p+4}} \leq \frac{(p+2)(p+3)}{48(k-\frac{1}{2})^{p+4}}$

On ajoute que: $|\int_k^{k-\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}} + \frac{1}{2k^{p+2}} - \frac{1}{8} G''(k)| \leq \frac{1}{48} \max_{t \in [k, k-\frac{1}{2}]} \frac{(p+2)(p+3)}{t^{p+4}} = \frac{(p+2)(p+3)}{48(k-\frac{1}{2})^{p+4}}$

$|\frac{1}{k^{p+2}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}}| = |\int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}} + \frac{1}{2k^{p+2}} - \frac{1}{8} G''(k) - (\int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}} - \frac{1}{2k^{p+2}} - \frac{1}{8} G''(k))|$

$|\frac{1}{k^{p+2}} - \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}}| \leq |\int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}} + \frac{1}{2k^{p+2}} - \frac{1}{8} G''(k)| + |\int_k^{k+\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{p+2}} - \frac{1}{2k^{p+2}} - \frac{1}{8} G''(k)| \leq \frac{(p+2)(p+3)}{48(k-\frac{1}{2})^{p+4}}$

en échangeant

ce qui donne finalement le résultat. Un grand bravo encore pour le concepteur.