

ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES
E.S.C.P.-E.A.P.
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LYON

CONCOURS D'ADMISSION SUR CLASSES PREPARATOIRES

OPTION SCIENTIFIQUE

MATHEMATIQUES I

Année 1997

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.

Ils ne doivent faire usage d'aucun document : l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

Le problème traite de quelques propriétés des polynômes de HERMITE qui constituent une famille orthogonale pour un certain produit scalaire qui sera étudié dans ce problème.

On notera $\mathbb{R}[X]$ (resp. $\mathbb{R}_n[X]$) l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels (resp. l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n), y compris le polynôme nul. Pour tout entier naturel k le polynôme X^k se confond avec la fonction polynomiale réelle $x \mapsto x^k$, en particulier X^0 est la fonction constante égale à 1.

On notera $[x]$ la partie entière d'un réel x .

Enfin on rappelle que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$.

Partie I : Trois résultats utiles par la suite

1. (a) Pour tout entier naturel n , justifier la convergence de l'intégrale

$$I_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

- (b) Etablir, pour tout entier $n \geq 2$, l'égalité: $I_n = (n-1)I_{n-2}$.

- (c) Soit n un entier naturel. Donner la valeur de I_{2n+1} et montrer que $I_{2n} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$.

- (d) Pour toute fonction polynomiale P , justifier la convergence de l'intégrale

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

2. On rappelle que si une suite de terme général v_n est telle que les deux sous-suites de termes généraux v_{2n} et v_{2n+1} convergent vers le même réel ℓ alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est elle-même convergente de limite ℓ .

Soit C un réel positif. Pour tout entier naturel n on pose $u_n = \frac{C^n}{\left[\frac{n}{2}\right]!}$.

- (a) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{C^{2n}}{n!}$. En déduire la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- (b) Montrer que la série de terme général $u_{2k} + u_{2k+1}$ (où $k \in \mathbb{N}$) converge et donner sa somme.
- (c) En déduire la convergence de la série de terme général u_n et la valeur de la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.
3. Soit a un réel strictement positif et soit g une fonction réelle indéfiniment dérivable sur $[-a, a]$ pour laquelle existe un réel positif K tel que, pour tout entier n :

$$\max_{t \in [-a, a]} |g^{(n)}(t)| \leq \frac{K^n n!}{\left[\frac{n}{2}\right]!}$$

- (a) Montrer que pour tout $\lambda \in [-a, a]$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\lambda \frac{(\lambda - t)^n}{n!} g^{(n+1)}(t) dt = 0$$

- (b) En déduire l'égalité suivante, valable pour tout $\lambda \in [-a, a]$:

$$g(\lambda) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} \lambda^n$$

Quelle simplification obtient-on si g coïncide sur $[-a, a]$ avec une fonction polynomiale de degré d ?

Partie II : Les polynômes de Hermite

1. Montrer que l'application $(P, Q) \mapsto \langle P, Q \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} P(x) Q(x) dx$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

On notera $\|\cdot\|$ la norme associée.

Ainsi, si n est un entier naturel, la restriction de ce produit scalaire aux polynômes de degré au plus n fait de $(\mathbb{R}_n[X], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

2. À l'aide de la base $(1, X, X^2, X^3)$, construire une base orthogonale de $(\mathbb{R}_3[X], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ formée de polynômes dont le coefficient de plus haut degré est 1.

Pour tout entier naturel n , on considère l'application H_n de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie pour tout réel x par:

$$H_n(x) = (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}} \left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right)^{(n)}$$

où, selon l'usage, $f^{(n)}(x)$ désigne la valeur en x de la dérivée $n^{\text{ième}}$ de f (en particulier $f^{(0)}(x) = f(x)$).

3. (a) Pour tout réel x calculer $H_0(x), H_1(x), H_2(x), H_3(x)$.
- (b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Etablir les relations

$$(1) \quad H_{n+1} = XH_n - nH_{n-1}, \quad (2) \quad H'_n = nH_{n-1}$$

Pour établir (1), on pourra remarquer que $\left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right)^{(n+1)} = \left(-xe^{-\frac{x^2}{2}} \right)^{(n)}$.

- (c) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, H_n est une fonction polynomiale dont on précisera, en fonction de n , le degré, la parité et le coefficient de plus haut degré.

4. On dispose du

Type Poly = array[0..20] of integer;

On nommera de la même façon un polynôme de degré au plus 20 et la variable de type **Poly** obtenue en stockant dans la case numéro k , $k \in \llbracket 0, 20 \rrbracket$, le coefficient de X^k dudit polynôme.

- (a) Ecrire la partie instruction (i.e. sans les déclarations) d'une procédure PASCAL dont l'en-tête est

Procedure MULTIX (P, Var Q: Poly);

qui stocke dans Q les coefficients du polynôme XP , P étant un polynôme de degré au plus 19.

- (b) A l'aide de (1), écrire la partie instruction d'une procédure PASCAL dont l'en-tête est

Procedure HERMITE (n:integer; Var H:Poly);

qui, étant donné un entier n , $n \in \llbracket 2, 20 \rrbracket$, stocke les coefficients de H_n dans la variable de H de type **Poly**.

Partie III : $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ comme famille de polynômes orthogonaux

1. (a) Montrer que si P est un polynôme et n un entier naturel non nul alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) \left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right)^{(n-1)} = 0.$$

De même, on montrerait et on **admet** que $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) \left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right)^{(n-1)} = 0$.

- (b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer

$$\langle H_n, H_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} H_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Pour n non nul, on utilisera la définition de H_n .

- (c) Soit $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$. En remarquant que

$$\langle H_n, H_m \rangle = \frac{(-1)^n}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} H_m(x) \left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right)^{(n)} dx$$

et à l'aide d'une intégration par parties que l'on effectuera avec soin, montrer que

$$\langle H_n, H_m \rangle = m \langle H_{n-1}, H_{m-1} \rangle$$

En déduire que $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille orthogonale de $\mathbb{R}[X]$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, que vaut $\langle H_n, H_n \rangle$?

2. (a) Soit $k \in \mathbb{N}$ et R une fonction polynomiale de degré au plus k . Que vaut $\langle H_{k+1}, R \rangle$?
 (b) Soit n un entier naturel, k un entier de $\llbracket 0, n \rrbracket$ et P un polynôme de degré au plus k . Etablir l'égalité

$$\|X^{k+1} - P\|^2 = \|H_{k+1}\|^2 + \|Q - P\|^2$$

où $Q = X^{k+1} - H_{k+1}$. On pourra calculer $\langle H_{k+1}, Q - P \rangle$.

Quelle est, dans l'espace euclidien $(\mathbb{R}_{n+1}[X], \langle \cdot, \cdot \rangle)$, la projection orthogonale de X^{k+1} sur le sous-espace vectoriel $\mathbb{R}_k[X]$?

- (c) On note $(G_k)_{k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket}$ la famille orthonormale de $(\mathbb{R}_{n+1}[X], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ obtenue par le procédé de SCHMIDT à partir de la base $(X^k)_{k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket}$. Pour tout $k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket$, déterminer G_k en fonction de $H_0, H_1, \dots, H_{n+1}$.

Partie IV : Un développement en série de Hermite

Soit n un entier naturel non nul.

1. Soit P un polynôme de degré au plus n . Justifier l'égalité suivante:

$$P = \sum_{k=0}^n \langle P, H_k \rangle \frac{H_k}{k!}$$

2. Pour tout couple (b, c) de réels vérifiant $b \leq c$, on **admet** qu'il existe un réel K (dépendant de b et c) tel que pour tout entier n et tout $x \in [b, c]$:

$$\left| \frac{H_n(x)}{n!} \right| \leq \frac{K^n}{\left[\frac{n}{2}\right]!}$$

- (a) Soit x un réel donné. À l'aide du 2) de la partie I établir, pour tout réel λ , la convergence de la série de terme général $\frac{H_n(x)}{n!} \lambda^n$.

- (b) Soit g_x (x est toujours un réel fixé) la fonction définie pour tout réel λ par $g_x(\lambda) = e^{-\frac{(\lambda-x)^2}{2}}$.
Pour tout réel λ et tout entier naturel n , calculer $g_x^{(n)}(\lambda)$ (c'est-à-dire $\frac{d^n g_x}{d\lambda^n}(\lambda)$) en fonction de H_n .
Montrer que g_x vérifie les hypothèses du 3) de la partie I et en déduire que pour tout $(x, \lambda) \in \mathbb{R}^2$:

$$e^{\lambda x - \frac{\lambda^2}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{H_n(x)}{n!} \lambda^n$$

- (c) On note $\exp$ la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$.
Pour tout entier naturel n , justifier rapidement la convergence de l'intégrale

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^x H_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

dont, par analogie, on note $\langle \exp, H_n \rangle$ la valeur.

Calculer $\langle \exp, H_n \rangle$ puis, pour tout réel x , conclure à l'égalité

$$\exp x = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle \exp, H_n \rangle \frac{H_n(x)}{n!}$$

Pour calculer $\langle \exp, H_n \rangle$, on pourra utiliser la définition de H_n et intégrer par parties (avec soin) afin d'obtenir $\langle \exp, H_n \rangle = \langle \exp, H_{n-1} \rangle$.