

Chapitre 5

Exemples de questions courtes

Soit l'application $\varphi : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui, à toute matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ associe la matrice $\begin{pmatrix} -a & c \\ b & -d \end{pmatrix}$.

1. φ est-elle diagonalisable ?
2. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de φ .

Soit un entier $n \geq 2$. Soit A une matrice symétrique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On suppose que A est définie positive, ce qui signifie qu'elle vérifie la propriété suivante :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}, \quad {}^t X A X > 0.$$

1. Montrer qu'il existe une matrice B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique définie positive telle que $B^2 = A$.
2. En déduire pour tout vecteur X de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, l'inégalité

$$\|X\|^4 \leq \langle X, A X \rangle \times \langle X, A^{-1} X \rangle.$$

Soient A et B deux matrices symétriques réelles d'ordre n telles que A possède n valeurs propres distinctes. On suppose que $AB = BA$ et que $A^5 = B^5$. Montrer que $A = B$.

On considère l'espace euclidien \mathbb{R}^n muni de son produit scalaire canonique, noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et u et v deux vecteurs orthogonaux de normes 1. On note f l'endomorphisme de \mathbb{R}^n défini par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad f(x) = \langle u, x \rangle v + \langle v, x \rangle u$$

On appelle trace de f la trace de la matrice de f dans une base quelconque. Calculer $\text{tr}(f)$.

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ et N l'application définie sur E par, pour tout $P \in E$

$$N(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |P^{(k)}(0)|$$

1. Montrer que $N(P)$ est bien défini.
2. Montrer que $N(P) = 0$ entraîne $P = 0$.
3. Soit $\Phi : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\Phi(P) = P(1)$.

Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $P \in E$

$$|\Phi(P)| \leq C \times N(P)$$

Soient $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\ell \in \mathbb{R}$ tels que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ et $\int_0^{+\infty} |f(x)| dx$ converge. Soient $a > 0$ et $b > 0$.

1. Montrer l'existence et calculer $\lim_{u \rightarrow -\infty} \int_u^{+\infty} (f(a+x) - f(b+x)) dx$.

2. En déduire $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^x}{(1+ae^x)(1+be^x)} dx$.

Soit $\sigma > 0$. Soit $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires positives, indépendantes et de même loi telles que :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, E(X_k) = 1 \text{ et } V(X_k) = \sigma^2.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et $Z_n = \frac{2}{\sigma} (\sqrt{S_n} - \sqrt{n})$.

Montrer que la suite (Z_n) converge en loi vers une variable aléatoire qui suit la loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

On considère deux variables aléatoires X, Y non nulles, définies sur le même espace probabilisé, admettant chacune un moment d'ordre 2. On note

$$M(X, Y) = \begin{pmatrix} V(X) & \text{cov}(X, Y) \\ \text{cov}(X, Y) & V(Y) \end{pmatrix}$$

1. Montrer que les valeurs propres de $M(X, Y)$ sont positives ou nulles.

2. Que peut-t-on dire de X, Y si $M(X, Y)$ n'est pas inversible ?

Soient $p \in]0, 1[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $q = 1 - p$. Soient trois variables aléatoires X, Y, Z définies sur un même espace probabilisé (Ω, \mathcal{A}, P) qui sont indépendantes, de lois respectives $\mathcal{B}(n, p)$, $\mathcal{B}(n, p)$ et $\mathcal{B}(n, q)$.

On définit la matrice aléatoire M par :

$$\forall \omega \in \Omega, M(\omega) = \begin{pmatrix} X(\omega) & Y(\omega) \\ 0 & Z(\omega) \end{pmatrix}$$

Calculer la probabilité que la matrice M soit diagonalisable.

Soit (Ω, \mathcal{A}, P) un espace probabilisé. Une famille d'événements $(A_n)_{n \geq 1}$ est appelée *quasi-complète* si :

• les événements (A_i) sont deux à deux incompatibles ;

• $P \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \right) = 1$.

La formule des probabilités totales est-elle vérifiée par une famille quasi-complète d'événements ?